

الشروط اللازمة والكافية التي يجب وضعها على الزمرة G حتى تكون

الزمرة U منتهية محلياً ومولدة بعدد منته من العناصر

صديق عبد العزيز مهدي

كلية التربية . قسم الحاسبات الجامعة المستنصرية

الخلاصة

لتكن U زمرة العناصر القابلة للقلب (Units Group) في حلقة الزمرة $A[G]$ حيث A حلقة ما و G زمرة ما. نجد في الأبحاث والدراسات الجبرية الحديثة اهتماماً كبيراً بمسألة التعرف على بنية الزمرة U من خلال معرفة بنية الزمرة G وبالعكس. في هذا البحث حاولنا الإجابة على السؤالين التاليين :

1 - ما هي الشروط اللازمة والكافية التي يجب وضعها على الزمرة G حتى تكون الزمرة U منتهية محلياً (locally Finite).

2 - ما هي الشروط اللازمة والكافية التي يجب وضعها على الزمرة G حتى تكون الزمرة U مولدة بعدد منته من العناصر (Finitely Generated).

1- المقدمة Introduction

إذا كانت R حلقة واحدة. وكانت U_R زمرة العناصر القابلة للقلب في R فان مسألة التعرف على بنية هذه الزمرة في حلقة محددة R هي من المسائل الجبرية الهامة ،ولقد استأثرت الحالة الخاصة التالية من هذه المسألة اهتمام الباحث الجبري (Polcino Milier) في العقود الأربعة الأخيرة من القرن المنصرم ،ومازالت:

إذا كانت A حلقة ما و G زمرة ضربية ما ،فان المطلوب هو التعرف على بنية وخصائص الزمرة U_R في حلقة الزمرة $R = A[G]$. وفي بعض الدراسات والأبحاث الجبرية اهتمت بدراسة الزمرة U_R ومحاولة إيجاد الشروط اللازمة والكافية التي تحملها G حتى تكون U_R ذات خاصية ما. فمثلاً أثبت (Polcino Milier) في [5] أنه إذا كانت G منتهية . عندئذٍ U_R دورية أو عديمة قوة فإن G ستكون إبدالية أو 2 - زمرة هاملتونية والعكس صحيح. و في [6] بُرهن على أنه عندما G منتهية فإن U_R تكون FC - زمرة إذا و فقط إذا كانت G إما إبدالية أو 2 - زمرة هاملتونية.

2- الشروط اللازمة و الكافية لكي تكون U منتهية محلياً :

نوه هنا إلى ان G سترمز لزمرة ضربية (Multiplication Group) ليس من الضروري أن تكون منتهية . قبل أن نتناول تلك الشروط الواجب و وضعها على الزمرة G حتى تكون U منتهية محلياً يجب أن نتطرق الى تعريف الزمرة المنتهية محلياً.

تعريف 1.2 :

يقال عن زمرة X إنها منتهية محلياً إذا كانت كل زمرة جزئية منتهية التوليد من الزمرة X منتهية.

ملاحظة 2.2 :

من الواضح أنه إذا كانت U منتهية محلياً فإن G منتهية محلياً لأن زمرة جزئية من U و لكن العكس ليس من الضروري أن يكون صحيحاً فإذا أخذنا زمرة منتهية وليست 2 - زمرة هاملتونية وليست ابدالية فإن U ليست دورية بحسب المبرهنة في [1] و لذلك سوف تحوي حتماً عنصراً واحداً على الأقل رتبته غير منتهية مثل x ، و عندئذ $\langle x \rangle$ زمرة جزئية من U منتهية التوليد وليست منتهية.

حتى و لو كانت G زمرة تبديلية و منتهية فإن U ليس من الضروري أن تكون منتهية محلياً كما تظهر المبرهنة التالية و نتائجها:

مبرهنة 3.2 : [4]

إذا كانت X زمرة عديمة قوة و مولدة بعدد منتهٍ من العناصر الدورية فإن X ستكون منتهية.

نتيجة 4.2 :

إذا كانت U عديمة قوة و مولدة بعدد منتهٍ من العناصر الدورية فإن U ستكون منتهية وبالتالي V منتهية ومنه فإن $|V| \leq |G|$ ، وبما أن $G \subseteq V$ فإن $V = G$ و بالتالي $U = \pm G$ و ينتج عن [7 , Th. 4.1] أن G ستكون في هذه الحالة :

إما ابدالية حيث $G^4 = \{1\}$

أو ابدالية حيث $G^6 = \{1\}$

أو 2 - زمرة هاملتونية.

نتيجة 5.2 :

إذا كانت G زمرة منتهية و ابدالية و تحوي عنصراً x رتبته ليست 4 و ليست 6 فإن U منتهية التوليد لأن G منتهية بحسب [8] و U عديمة قوة (Nilpotent Group) لأنها ابدالية.

و بحسب النتيجة السابقة فإن أحد مولدات U سيكون ذو رتبة غير منتهية و بالتالي U ليست منتهية محلياً.

و بشكل أعم لدينا النتيجة التالية:

نتيجة 6.2 :

إذا كانت G زمرة منتهية التوليد (Finitely Generated) و تحوي عنصراً x رتبته ليست 4 وليست 6 و G

ليست 2 - زمرة هاملتونية فإن U ليست منتهية محلياً.

البرهان :

لو كانت U منتهية محلياً لنتج عن كون G زمرة جزئية من U و منتهية التوليد أن G منتهية ، اذن G منتهية ثم ان U دورية لانه اذا كان u من U فان $\langle u \rangle$ منتهية أي أن رتبة u منتهية و ينتج عن النظرية (4.1) من [7] أنه إما G ابدالية و $G^4 = \{1\}$ و بالتالي G تحوي عنصراً رتبته 4 و هذا يناقض الفرض . أو G ابدالية و $G^6 = \{1\}$ و بالتالي G تحوي عنصراً رتبته 6 و هذا يناقض الفرض أيضاً . أو G هي -2 زمرة هاملتونية و هذا أيضاً يناقض الفرض . إذن لا يمكن أن تكون U منتهية محلياً .

نتيجة 7.2 :

إذا كانت U منتهية محلياً و G منتهية التوليد فإن $U = \pm G$

البرهان :

بما ان G منتهية التوليد و U منتهية محلياً فان G ستكون منتهية لان G زمرة جزئية من U ثم ان كون U منتهية محلياً يؤدي الى أن U دورية بحسب ما تقدم في برهان (6.2) . ليكن $u \in U$ وليكن $g \in \text{supp}(u)$ عندئذ ينتج عن كون U منتهية محلياً أن $\langle u, g \rangle$ زمرة جزئية منتهية وبما أن $ug^{-1} \in \langle u, g \rangle$

فان ug^{-1} ذو رتبة منتهية امثال e في عبارته ليست صفراً ولذلك فهو مبتدل بحسب [2] أي أن

$$ug^{-1} = \pm g_1 \quad ; \quad g_1 \in G$$

ومنه

$$u = \pm g_1 g = \pm g_2 \quad ; \quad g_2 \in G$$

أي أن $u \in \pm G$.

اذن $U \subseteq \pm G$ كما أن $\pm G \subseteq U$ وبالتالي $U = \pm G$

ملاحظة 8.2 :

إذا كانت G ، 2 - زمرة هاملتونية فإن U منتهية محلياً لان $U = \pm G$ بحسب [7] أي ان U منتهية ولذلك فهي منتهية محلياً .

3- الشروط اللازمة و الكافية لكي تكون U منتهية التوليد

سنحاول في هذه الفقرة الإجابة على السؤال التالي:

ما هو الشرط اللازم والكافي الواجب فرضه على G حتى تكون U منتهية التوليد؟

في هذا الموضوع لدينا النتائج التالية:

مبرهنة 1.3 : [8]

1 - إذا كانت U منتهية التوليد فإن G منتهية التوليد .

2 - إذا كانت G منتهية فإن U منتهية التوليد.

إن عكس (1) من المبرهنة (1.3) ليس صحيحاً بشكل عام أي أنه توجد زمرة G منتهية التوليد ولكن U غير منتهية التوليد. كما يوضح المثال التالي:

مثال 2.3 : [8]

إذا كانت G امتداداً للزمرة D_8 بزمرة دائرية C غير منتهية ($G = D_8 \times C$) فإن G منتهية التوليد لأن D_8 منتهية و C منتهية التوليد و لكن U ليست منتهية التوليد كما يذكر المرجع [8] عن Sehgal و Mareniak .
إن عكس (2) من المبرهنة (1.3) هو أيضاً غير صحيح بشكل عام كما يظهر المثال (3.5) .

مبرهنة 3.3 : [8]

إذا كانت G امتداداً للزمرة ذات التفاف T بزمرة ذات التفاف حر torsion free و عديمة قوة K ($G = T \times K$) وكانت $Z[G]$ لا تملك عناصر عديمة قوة فإن $U_G = U_T . G$

تمهيدية 4.3 : [1]

إذا كانت A خالية من قواسم الصفر و G هي $\Omega -$ زمرة فإن $A[G]$ خالية من قواسم الصفر وبالتالي لا تحوي عناصر عديمة قوة.

مثال 3.5 :

إذا كانت G زمرة دائرية غير منتهية فإن U ستكون منتهية التوليد مع أن G غير منتهية.

البرهان:

نضع في المبرهنة (3.3) $T = \{e\}$ و $K = G$ فنجد أن $Z[G]$ خالية من قواسم الصفر بحسب (4.3) و بالتالي $Z[G]$ خالية من العناصر عديمة القوة و لذلك فإن:

$$U_G = U_T . G \\ = \{-1, 1\} \times G$$

بحسب (3.3) و بالتالي U منتهية التوليد لأن G مولدة بعنصر واحد .

كما و يمكن أن نستخلص من المبرهنة (3.3) النتيجة التالية:

نتيجة 6.3 :

إذا كانت $G = T \times K$ حيث T منتهية و K ذات التفاف حر و منتهية التوليد فإنه إما $Z[G]$ تحوي عناصر عديمة قوة أو U تكون منتهية التوليد.

البرهان :

إذا كانت $Z[G]$ لا تحوي عناصر عديمة القوة (غير الصفر) فإنه ينتج عن المبرهنة (3.3) أن

$$U_G = U_T . G$$

و بما أن T منتهية فإن U_T ستكون منتهية التوليد بحسب (1.3). كما أنه ينتج عن فرضنا K منتهية التوليد و T منتهية أن G منتهية التوليد و بالتالي $U_T.G$ ستكون منتهية التوليد ، أي أن U_G منتهية التوليد.

مبرهنة 7.3 : [8]

إذا كانت G زمرة عديمة قوة فإن U منتهية التوليد إذا و فقط إذا كانت G إما منتهية أو منتهية التوليد و $Z[G]$ لا تحوي عناصر عديمة القوة.
من هذه المبرهنة نستخلص النتيجة التالية:

نتيجة 8.3 :

- لنكن G زمرة عديمة قوة و منتهية التوليد و غير منتهية. عندئذ لدينا واحد من الأمرين التاليين محقق :
- 1- $Z[G]$ لا تحوي عناصر عديمة القوة وبالتالي U منتهية التوليد.
 - 2- $Z[G]$ تحوي عناصر عديمة القوة وينتج عنه أن U ليست منتهية التوليد .

• يمكن أن نستخلص بسهولة من النتيجة السابقة أنه إذا كانت G ابدالية ومنتهية التوليد وبدون التقاف فإن U منتهية التوليد.

ولكن لدينا ما هو أعم من ذلك يمكن أن نستخلصه من التمهيديّة التالية :

تمهيدية 9.3 : [3]

إذا كانت G زمرة منتهية التوليد وعديمة قوة فإن C_U زمرة منتهية التوليد .

نتيجة 10.3.3 :

إذا كانت G ابدالية فإن :

G منتهية التوليد إذا و فقط إذا كانت U منتهية التوليد .

البرهان :

إذا كانت G منتهية التوليد فإنه ينتج عن كون G ابدالية أن G منتهية التوليد وعديمة قوة وبحسب التمهيديّة السابقة تكون C_U زمرة منتهية التوليد ولكن $C_U=U$ لأن U ابدالية وبالتالي ستكون U منتهية التوليد .
العكس ينتج عن (1.3) .

تمهيدية 11.3 :

إذا كانت U منتهية محلياً فإن G منتهية التوليد $\Leftrightarrow U$ منتهية التوليد.

البرهان:

\Leftarrow بما أن U منتهية محلياً و G منتهية التوليد فإن G ستكون منتهية لأنها زمرة جزئية من U وبحسب (1.3)
ستكون U منتهية التوليد.
 \Rightarrow ينتج مباشرة عن المبرهنة (1.3) .

References

- [1] - Ahmad, M.K. , **On The Units Group of $Z[G]$ and Isomorphism Problem of Group Rings** , Research J. of Aleppo Univ. Vol. 10 , 1988 . PP. 31- 35 .
- [2] - Buthessh , S., **On Units Group of The Ring $Z[G]$** , Research J. of Aleppo Univ. , Vol. 18 , 1994 , PP . 9 -15 .
- [3] - Jespers , E. Parmenter , M. , Sehgal, S. , **Central Units of Integral Group Rings of Nilpotent Groups**, Proc. of the Amer. Math. Soc. , Vol. 124 , No. 4, 1996 . PP .1007 - 1012 .
- [4] - Macdonald, I., D., **The Theory of Groups**, Oxford press, London, 1968.
- [5] - Polcino Milier, c., **Integral Group Ring with Nilpotent Units Group**, Canad. J. Math. (5) 28 , 1976 , PP. 954 - 960 .
- [6] - Sehgal , S., K. and Zassenhaus , H.J. , **Group Rings Whose Units Form an FC-Group** , Math. Z, 153 , 1977 , PP. 29 - 35 .
- [7] - Sehgal, S., K., **Topics in Group Rings**, Mercel Dekker, New York, 1978.
- [8] - Wiechecki, L., **Finitely Generated Group Rings Units**, Proc. Amer. Math. Soc. Vol. 127 (1) , 1999 ,PP 51-55.

The Sufficient and Necessary Conditions on Group G So that U is Locally Finite and Finitely Generated

Abstract

Let G be a group and A be a ring . Let U be the units group in the group ring $A[G]$. Many recent studies in algebra deal with the structure of the group U knowing the structure of the group G and vice versa. In this paper we tried to prove the following problems :

1. What are the necessary and sufficient conditions on G so that U is locally finite?
2. What are the necessary and sufficient conditions on G so that U is finitely generated ?